

# Esercitazione 10

Geometria e Algebra Lineare GE110 - AA 2022–2023

15 Maggio 2023

**Esercizio 1.** Per ognuna delle seguenti applicazioni, si determini se sono applicazioni lineari. In caso affermativo si calcoli il nucleo e si discuta se l'applicazione è iniettiva, suriettiva e/o un isomorfismo.

1.  $f_1 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$  definita da

$$f_1 \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x - y \\ y - 2z \end{pmatrix}.$$

2.  $f_2 : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$  definita da

$$f_2 \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x - y \\ y - z \\ z - w \\ 1 \end{pmatrix}.$$

3.  $f_3 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  definita da

$$f_3 \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + z \\ y + z \\ x + y + 2z \end{pmatrix}.$$

4.  $f_4 : \mathbb{R}[x]_{\leq 3} \rightarrow \mathbb{R}[x]_{\leq 3}$  definita da  $f_4(p(x)) = p(x) - p(0)$ .

**Esercizio 2.** Siano dati i seguenti vettori:

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \quad w_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad w_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad w_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$$

1. Esiste un'applicazione lineare  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$  tale che  $f(v_1) = w_1$ ,  $f(v_2) = w_2$  e  $f(v_3) = f(w_3)$ ?
2. Esiste un'applicazione lineare  $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$  tale che  $f(v_1) = w_1$  e  $g(v_2) = w_2$ ?

**Esercizio 3.** Per ognuna delle seguenti terne di spazi vettoriali, funzioni e basi si calcoli la matrice  $M_{\mathcal{B}_2, \mathcal{B}_1}(f)$  associata alla funzione rispetto alle basi date:

1.

$$f_1 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3 \quad f_1 \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x \\ x - y \\ y \end{pmatrix} \quad \mathcal{B}_1 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \quad \mathcal{B}_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

2.

$$f_2 : \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}^2 \quad f_2 \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} iy \\ -x \end{pmatrix} \quad \mathcal{B}_1 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \quad \mathcal{B}_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$$

3.

$$f_3 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 \quad f_3 \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ z \\ x + y + z \end{pmatrix} \quad \mathcal{B}_1 = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \quad \mathcal{B}_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

**Esercizio 4.** Per ognuna delle seguenti applicazioni lineari si calcolino la matrice associata rispetto alle basi canoniche, il nucleo, l'immagine, la dimensione del nucleo, il rango, e si discuta se l'applicazione é iniettiva e/o suriettiva e/o un isomorfismo.

1.  $f_1 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$  data da

$$f_1 \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 2y \\ 2x - 5y \\ 7y \end{pmatrix}$$

2.  $f_2 : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$  data da

$$f_2 \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \\ x_2 - x_4 \\ x_1 + 3x_3 + 6x_4 \end{pmatrix}$$

3.  $g_1 : \mathbb{R}[x]_{\leq 3} \rightarrow \mathbb{R}[x]_{\leq 3}$  data da  $g_1(p(x)) = p'(x)$ .

**Esercizio 5.** (\*) Sia  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  l'applicazione lineare definita da

$$f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x - y \\ 4x - 4y \end{pmatrix}$$

e si consideri l'applicazione lineare

$$\Phi : \text{Hom}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2) \rightarrow \text{Hom}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2) \quad \Phi(g) = f \circ g.$$

- Dimostrare che  $\Phi$  é un'applicazione lineare.
- Determinare una base  $\mathcal{A}$  di  $\ker \Phi$ .
- Completare  $\mathcal{A}$  a una base di  $\text{Hom}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2)$ .