

Foglio 2 di Esercizi

Geometria - AA 2023–2024
Ingegneria Elettronica

22 ottobre 2023

Esercizio 1. Trovare una matrice A , 3×4 , in forma ridotta a gradini, tale che il sistema lineare associato ad $(A \mid \vec{b})$ con $\vec{b} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 6 \end{pmatrix}$ abbia le seguenti proprietà :

- x_3 sia una variabile libera;

- l'insieme di soluzioni sia $\left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 6 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} : s \in \mathbb{R} \right\}$.

Esercizio 2. Per ciascuna delle seguenti matrici si calcoli il rango.

1. $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$;

4. $\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$;

6. $\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & -2 & 0 \\ 1 & -1 & -3 & 2 \end{pmatrix}$;

2. $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$;

3. $\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$;

5. $\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$;

Esercizio 3. Trovare tutti i valori di z_1 e z_2 in \mathbb{R} tali che $\text{span}\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\} = \mathbb{R}^3$ dove:

$$\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \vec{v}_3 = \begin{pmatrix} -4 \\ z_1 \\ z_2 \end{pmatrix}.$$

Esercizio 4. Per ciascuno dei seguenti sistemi lineari si trovi i generatori dell'insieme di soluzioni, si discuta se essi siano o meno linearmente indipendenti, e si calcoli la loro dimensione.

$$\begin{array}{ll}
 1. \left\{ \begin{array}{l} X_1 + X_2 - X_3 + 2X_4 = 0 \\ X_1 - X_2 - X_4 = 0 \end{array} \right. ; & 5. \left\{ \begin{array}{l} X_1 + X_2 - X_3 + 2X_4 = 0 \\ X_1 - X_2 - X_4 = 0 \\ -X_1 + X_2 - X_3 = 0 \\ X_2 - 3X_4 = 0 \end{array} \right. ; \\
 2. \left\{ \begin{array}{l} X_1 + X_2 - X_3 + 2X_4 = 0 \\ X_1 - X_2 - X_4 = 0 \end{array} \right. ; & 6. \left\{ \begin{array}{l} X_1 + X_2 - X_3 + 2X_4 = 0 \\ X_1 - X_2 - X_4 = 0 \\ -X_1 + X_2 - X_3 = 0 \\ X_1 + X_2 - 2X_3 + X_4 = 0 \end{array} \right. . \\
 3. \left\{ \begin{array}{l} X_1 + X_2 - X_3 + 2X_4 = 0 \\ X_1 - X_2 - X_4 = 0 \\ -X_1 + X_2 - X_3 = 0 \end{array} \right. ; & \\
 4. \left\{ \begin{array}{l} X_1 + X_2 - X_3 + 2X_4 = 0 \\ 2X_1 + 2X_2 - 2X_3 + 4X_4 = 0 \end{array} \right. ; &
 \end{array}$$

Esercizio 5. Per ciascuno dei seguenti sottospazi vettoriali di \mathbb{R}^4 si trovino le equazioni cartesiane.

$$\begin{array}{ll}
 1. \text{span}\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}; & 4. \text{span}\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}; \\
 2. \text{span}\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}; & 5. \text{span}\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \\ -4 \end{pmatrix} \right\}; \\
 3. \text{span}\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}; & 6. \text{span}\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}.
 \end{array}$$

Esercizio 6. Siano dati i seguenti tre vettori di \mathbb{R}^3 :

$$\vec{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \vec{a}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \vec{a}_3 = \begin{pmatrix} t \\ -3 \\ -7 \end{pmatrix}.$$

(a) Trovare tutti i valori di $t \in \mathbb{R}$ tali che l'equazione vettoriale

$$\vec{a}_1 x_1 + \vec{a}_2 x_2 + \vec{a}_3 x_3 = \vec{b}$$

abbia un'unica soluzione per ogni $\vec{b} \in \mathbb{R}^3$ (si argomenti la risposta).

(b) I vettori \vec{a}_1 e \vec{a}_2 sono linearmente indipendenti? Perché?

- (c) Si consideri il vettore $\vec{a}_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ -5 \end{pmatrix}$. Senza fare ulteriori calcoli, si trovi tutti i valori di t per cui esiste un'unica soluzione all'equazione vettoriale

$$\vec{a}_1x_1 + \vec{a}_2x_2 + \vec{a}_3x_3 + \vec{a}_4x_4 = \vec{c}$$

per ogni vettore $\vec{c} \in \mathbb{R}^3$ (si argomenti la risposta).

Esercizio 7. Per ognuna delle seguenti situazioni, dare un esempio (quando è possibile) o spiegare perché non è possibile.

- (a) Un insieme di vettori che non genera \mathbb{R}^3 . Aggiungendo un ulteriore vettore, il nuovo insieme non genera \mathbb{R}^3 ;
- (b) Un insieme di vettori linearmente indipendenti in \mathbb{R}^3 . Aggiungendo un ulteriore vettore il nuovo insieme è linearmente dipendente;
- (c) Un insieme di vettori in \mathbb{R}^3 con le seguenti proprietà (4 possibilità):

generano \mathbb{R}^3 , lin. indipendenti	generano \mathbb{R}^3 , lin. dipendenti
non generano \mathbb{R}^3 , lin. indipendenti	non generano \mathbb{R}^3 , lin. dipendenti

Per ogni caso che è possibile, quanti vettori può contenere l'insieme (elencare tutte le restrizioni, nel senso di *al più ... o almeno ...*);

- (d) Un sistema di equazioni con un'unica soluzione. Dopo aver aggiunto un'equazione il sistema ha infinite soluzioni.
- (e) Un sistema di equazioni senza soluzioni. Dopo aver cancellato un'equazione il sistema ha infinite soluzioni.

Esercizio 8. Siano dati i seguenti polinomi nello spazio vettoriale $\mathcal{P}_3(\mathbb{R})$ dei polinomi di grado al più tre:

$$p_1(x) = 1 + x \quad p_2(x) = 1 + x^2 \quad p_3(x) = 1 + x^3 \quad p_4(x) = 1 - x + x^2 + x^3.$$

1. Discutere se i polinomi p_1, p_2, p_3 e p_4 sono linearmente indipendenti; in caso negativo si esprima uno dei polinomi come combinazione lineare degli altri.
2. Discutere se $\text{span}\{p_1, p_2, p_3, p_4\} = \mathcal{P}_3(\mathbb{R})$.