

# Argomento 8

## Integrali indefiniti

### 8.1 Integrale indefinito

**Definizione 8.1** Assegnata la funzione  $f$  definita nell'intervallo  $I$ , diciamo che una funzione  $F$  con  $F : I \rightarrow \mathbb{R}$  è **una primitiva di  $f$  in  $I$**  se

- i)  $F$  è derivabile in  $I$ ;
- ii)  $F'(x) = f(x)$ , per ogni  $x \in I$ .

Per *verificare* se una data funzione  $F$  è una primitiva di  $f$  nell'intervallo  $I$  bisogna quindi controllare che  $F$  sia derivabile in  $I$  e che la sua derivata coincida con  $f$  in tutti i punti di  $I$ .

**Esempio 8.2** La funzione  $F(x) = \sin x$  è una primitiva di  $f(x) = \cos x$  in  $\mathbb{R}$ . Infatti, la funzione  $\sin x$  è sempre derivabile e inoltre si ha che  $(\sin x)' = \cos x$ , per ogni  $x$ .

Data una funzione  $f$ , *cercare* una sua primitiva in  $I$  significa quindi cercare una funzione derivabile  $F$  la cui derivata coincida con  $f$  (ossia, la ricerca delle primitive è il procedimento “inverso” della derivazione).

Ci poniamo le seguenti domande:

1. data una funzione  $f$  esiste sempre una sua primitiva in  $I$ ?
2. se una primitiva esiste, è unica?
3. come trovarla?

Il Teorema fondamentale del calcolo integrale (vedi Arg. 9) risponde alla prima di queste domande implicando che vale la seguente:

**Proposizione 8.3** *Ogni funzione continua in un intervallo  $I$  ammette una primitiva in  $I$ .*

Quindi almeno per le funzioni *continue* siamo certi dell'esistenza di una primitiva.

In realtà, non solo di una. Infatti osserviamo che le funzioni  $F(x) = \sin x$ ;  $G(x) = \sin x + 2003$ ;  $H(x) = \sin x - \pi$ ; ... sono tutte primitive di  $f(x) = \cos x$ .

In generale, vale:


**Proposizione 8.4** *Se una funzione  $f$  ammette una primitiva  $F$  in un intervallo  $I$ , allora:*

- i) *ogni funzione della forma  $F + c$  è anch'essa una primitiva di  $f$ , comunque si scelga la costante reale  $c$ ;*
- ii) *ogni altra primitiva  $G$  di  $f$  in  $I$  ha la forma  $G = F + c$  per un'opportuna costante reale  $c$ .*

In altre parole, se la funzione  $f$  ammette una primitiva  $F$  in  $I$ , ne ammette infinite che sono esattamente tutte quelle che si ottengono aggiungendo alla funzione  $F$  una qualunque costante<sup>1</sup>. Cioè, il grafico di ognuna di esse si ottiene da quello di  $F$  per mezzo di una traslazione verticale. Ad esempio, nella prossima figura sono evidenziati i grafici delle funzioni  $F(x) = x^2$ ,  $G(x) = x^2 + 4$ ,  $H(x) = x^2 - 5$ ; queste tre funzioni sono primitive, in  $\mathbb{R}$ , della stessa  $f(x) = 2x$ .

---

<sup>1</sup>Questo è una conseguenza del Teorema di Lagrange (vedi Arg. 6).



**Definizione 8.5** Data una funzione  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ , l'insieme delle sue primitive si chiama **integrale indefinito** di  $f$  e si indica con il simbolo  $\int f(x) dx$ .

Quindi,

$$\int f(x) dx = \{F : I \rightarrow \mathbb{R} \text{ derivabili in } I \text{ e tali che } F'(x) = f(x) \text{ per ogni } x \in I\}.$$

La Proposizione 8.4 può essere riformulata dicendo che:

Se  $F$  è una primitiva di una data funzione  $f$ , allora

$$\int f(x) dx = F(x) + c, \quad \text{per ogni } c \in \mathbb{R}.$$

Nel seguito, con la lettera  $c$  indicheremo un'arbitraria costante reale.

**Esempio 8.6** Derivando i termini a secondo membro possiamo verificare che:

- $\int \cos x dx = \sin x + c.$
- $\int 2x dx = x^2 + c.$
- $\int e^x dx = e^x + c.$
- Nell'intervallo  $I_1 = (0, +\infty)$  una primitiva della funzione  $f(x) = \frac{1}{x}$  è la funzione  $\log x$ ; invece nell'intervallo  $I_2 = (-\infty, 0)$  una primitiva di  $f(x) = \frac{1}{x}$  è la funzione  $\log(-x)$ . Per brevità si usa scrivere

$$\int \frac{1}{x} dx = \log |x| + c,$$

e questa formula vale in ogni intervallo che non contiene  $x = 0$ .

Il calcolo esplicito delle primitive può, in generale, rappresentare un problema non banale.

Certamente conosciamo le primitive di molte funzioni elementari, utilizzando la tabella delle loro derivate (vedere Arg. 6).

## 8.2 Tabella delle primitive “immediate”

$\int 1 dx = x + c$	(1)
$\int x^a dx = \frac{x^{a+1}}{a+1} + c, \quad a \neq -1$	(2)
$\int \frac{1}{x} dx = \log  x  + c$	(3)
$\int e^x dx = e^x + c$	(4)
$\int a^x dx = \frac{a^x}{\log a} + c, \quad a > 0, a \neq 1$	(5)
$\int \cos x dx = \sin x + c$	(6)
$\int \sin x dx = -\cos x + c$	(7)
$\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + c$	(8)

**Esempio 8.7** Utilizzando la formula (2) ricaviamo:

- $\int x^3 dx = \frac{x^4}{4} + c;$
- $\int \sqrt{x} dx = \frac{1}{1+\frac{1}{2}} x^{1+\frac{1}{2}} + c = \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} + c;$
- $\int \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \frac{1}{1-\frac{1}{2}} x^{1-\frac{1}{2}} + c = 2x^{\frac{1}{2}} + c = 2\sqrt{x} + c;$
- $\int \sqrt[3]{x} dx = \frac{1}{1+\frac{1}{3}} x^{1+\frac{1}{3}} + c = \frac{3}{4} x^{\frac{4}{3}} + c$

Mentre con la formula (5) otteniamo:

- $\int 2^x dx = \frac{2^x}{\log 2} + c.$

**Osservazione.** Notiamo che:

- $\int \cos(x+5) dx = \sin(x+5) + c$
- $\int e^{3x} dx = \frac{1}{3}e^{3x} + c.$

Dagli esempi precedenti possiamo dedurre che: se  $F$  è una primitiva della funzione  $f$  e  $a$  e  $b$  sono due numeri reali, con  $a \neq 0$ , si ha

$$\int f(ax+b) dx = \frac{1}{a}F(ax+b) + c.$$

Questa formula è un caso particolare del metodo di integrazione per sostituzione.

## Proprietà dell'integrale indefinito

Per determinare le primitive di funzioni che si ottengono sommando tra loro le funzioni elementari, e/o moltiplicandole per una costante, è utile la seguente

**Proposizione 8.8** *Siano  $f$  e  $g$  continue in un intervallo  $I$ , allora*

1)  $\int af(x)dx = a \int f(x) dx$ , per ogni  $a \in \mathbb{R}$ .

2)  $\int [f(x) + g(x)] dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$

**Esempio 8.9** Determiniamo l'integrale indefinito di:

- $f(x) = 3 \cos x + \frac{5}{\sqrt{x}}$ ;

$$\int \left( 3 \cos x + \frac{5}{\sqrt{x}} \right) dx = 3 \int \cos x dx + 5 \int \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 3 \sin x + 10\sqrt{x} + c.$$

- $f(x) = \frac{4}{x} + 2x - \frac{1}{3}e^x$ ;

$$\int \left( \frac{4}{x} + 2x - \frac{1}{3}e^x \right) dx = 4 \int \frac{1}{x} dx + 2 \int x dx - \frac{1}{3} \int e^x dx = 4 \log|x| + x^2 - \frac{1}{3}e^x + c.$$

- $f(x) = \frac{x^2\sqrt{x} + 2}{x^3}$ ;

$$\int \left( \frac{x^2\sqrt{x} + 2}{x^3} \right) dx = \int x^{-\frac{1}{2}} dx + 2 \int x^{-3} dx = 2\sqrt{x} - \frac{1}{x^2} + c.$$

- $f(x) = \frac{(x+2)^3}{x}$ ;

$$\int \frac{(x+2)^3}{x} dx = \int x^2 dx + 6 \int x dx + 12 \int dx + 8 \int \frac{dx}{x} = \frac{x^3}{3} + 3x^2 + 12x + 8 \log|x| + c.$$

- $f(x) = \frac{x}{x-1}$ ;

$$\int \frac{x}{x-1} dx = \int \frac{x-1+1}{x-1} dx = \int dx + \int \frac{1}{x-1} dx = x + \log|x-1| + c.$$

### 8.3 Integrazione per sostituzione

Date le funzioni  $f$  e  $g$ , ricordiamo (vedi Arg. 6) che la derivata della funzione composta  $(g \circ f)$ , quando ha senso, è data da:

$$(g \circ f)'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x).$$

Leggendo da destra a sinistra questa formula possiamo quindi ricavare che le primitive di una funzione che si presenta nella forma  $g'(f(x)) \cdot f'(x)$  sono le funzioni  $(g \circ f)(x) + c = g(f(x)) + c$ , ossia

$$\int g'(f(x)) \cdot f'(x) dx = g(f(x)) + c.$$

Nella successiva tabella sono stati riportati alcuni esempi di integrazione di funzioni composte della forma  $g'(f(x)) \cdot f'(x)$  quando la funzione  $g$  è una particolare funzione elementare.

$\int [f(x)]^a \cdot f'(x) dx = \frac{[f(x)]^{a+1}}{a+1} + c, \quad a \neq -1$	(9)
$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \log  f(x)  + c$	(10)
$\int e^{f(x)} \cdot f'(x) dx = e^{f(x)} + c$	(11)
$\int a^{f(x)} \cdot f'(x) dx = \frac{a^{f(x)}}{\log a} + c, \quad a > 0, a \neq 1$	(12)
$\int f'(x) \cdot \cos(f(x)) dx = \sin(f(x)) + c$	(13)
$\int f'(x) \cdot \sin(f(x)) dx = -\cos(f(x)) + c$	(14)
$\int \frac{f'(x)}{1+f^2(x)} dx = \arctan(f(x)) + c$	(15)

**Esempio 8.10** Per determinare le primitive della funzione  $h(x) = (e^x + 2x) \cos(e^x + x^2)$  riconosciamo inizialmente che  $h(x)$  è della forma  $f'(x) \cos(f(x))$  con  $f(x) = e^x + x^2$ .

Quindi, dalla (13) si ha

$$\int (e^x + 2x) \cos(e^x + x^2) dx = \sin(e^x + x^2) + c.$$

**Esempio 8.11** Determiniamo le primitive delle seguenti funzioni.

- $h(x) = (\sin x)^3 \cdot \cos x$ .

La funzione da integrare si può pensare come  $f'(x) [f(x)]^3$  con  $f(x) = \sin x$ . Quindi per la (9) della tabella precedente (con  $a = 3$ )

$$\int (\sin x)^3 \cdot \cos x \, dx = \frac{1}{4} (\sin x)^4 + c.$$

- $h(x) = (3x^2 + 2) e^{x^3+2x}$ .

La funzione da integrare è della forma  $f'(x)e^{f(x)}$  con  $f(x) = x^3 + 2x$ . Quindi, per la (11) :

$$\int (3x^2 + 2) e^{x^3+2x} \, dx = e^{x^3+2x} + c.$$

- $h(x) = \frac{\cos x}{\sin x}$ .

Qui la funzione integranda è della forma  $\frac{f'(x)}{f(x)}$  con  $f(x) = \sin x$ . Quindi, dalla (10) otteniamo

$$\int \frac{\cos x}{\sin x} \, dx = \log |\sin x| + c.$$

Le formule della tabella precedente sono casi particolari della seguente formula generale che si ottiene ancora dalla regola di derivazione di una funzione composta:

Se  $G$  è una primitiva di  $g$  allora  $\int (g(f(x)) \cdot f'(x) \, dx = G(f(x)) + c$

Come utilizzare questa formula? Risulta conveniente operare il cambiamento di variabile  $t = f(x)$ , che permette di sostituire l'espressione  $f'(x) \, dx$  con il termine  $dt$ . Quindi<sup>2</sup>

$$\int g(f(x)) \cdot f'(x) \, dx \quad \text{diventa} \quad \int g(t) \, dt. \quad (*)$$

Una volta calcolato quest'ultimo integrale indefinito, occorre risostituire  $f(x)$  al posto di  $t$ .

**Esempio 8.12** Calcoliamo le primitive di:

- $h(x) = (x + 4)^{17}$ .

In questo caso non occorre svolgere tutti i calcoli. Infatti ponendo  $t = x + 4$ , si ha  $dt = dx$  e poichè  $\int t^{17} \, dt = \frac{1}{18} t^{18} + c$  si ottiene:

$$\int (x + 4)^{17} \, dx = \frac{1}{18} (x + 4)^{18} + c.$$

- $h(x) = \cos(2x + 3)$ .

Ponendo  $t = 2x + 3$ , si ha  $dt = 2dx$ , e poichè  $\sin t$  è una primitiva di  $\cos t$ , abbiamo

$$\int \cos(2x + 3) \, dx = \frac{1}{2} \sin(2x + 3) + c.$$

---

<sup>2</sup>Mostrare in modo approfondito la relazione  $dt = f'(x) \, dx$  esula dallo scopo di queste note. Ai fini del calcolo di primitive può però bastare la semplice regola "formale":  $t = f(x) \implies dt = f'(x) \, dx$ .

- $h(x) = \frac{2x + 3}{(x^2 + 3x + 5)^{\frac{3}{2}}}$ .

Posto  $t = x^2 + 3x + 5$ , da cui  $dt = (2x + 3) dx$ , si ottiene:

$$\int \frac{2x + 3}{(x^2 + 3x + 5)^{\frac{3}{2}}} dx = -\frac{2}{\sqrt{x^2 + 3x + 5}} + c$$

- $h(x) = xe^{x^2} dx$ .

Ponendo  $t = x^2$ ,  $dt = 2x dx$ , si perviene a:

$$\int xe^{x^2} dx = \frac{1}{2} e^{x^2} + c.$$

- $h(x) = \cos^2 x$ .

Ricordando le identità trigonometriche  $2\cos^2 x = 1 + \cos 2x$  e  $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$ , e ponendo  $t = 2x$  si ottiene

$$\int \cos^2 x dx = \frac{1}{2} (\cos x \sin x + x) + c.$$

In modo del tutto analogo si ha anche che

$$\int \sin^2 x dx = \frac{1}{2} (-\cos x \sin x + x) + c.$$

## 8.4 Integrazione per parti

Abbiamo visto (Arg. 6) che se  $f$  e  $g$  sono derivabili in  $I$  lo è anche il loro prodotto e

$$(f \cdot g)'(x) = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x).$$

Questa formula può essere riletta come:

$$f(x) \cdot g(x) = \int f'(x) \cdot g(x) dx + \int f(x) \cdot g'(x) dx$$

e quindi

$$\boxed{\int f(x) \cdot g'(x) dx = f(x) \cdot g(x) - \int f'(x) \cdot g(x) dx.} \quad (\clubsuit)$$

La  $(\clubsuit)$  non risolve il problema di determinare una primitiva di  $f(x) \cdot g'(x)$ , ma lo trasforma nel problema di determinare una primitiva di  $f'(x) \cdot g(x)$ ; talvolta, se siamo fortunati e operiamo attentamente, questo è più semplice.

(In  $(\clubsuit)$  il termine  $f(x)$  si chiama *fattore finito*, mentre  $g'(x)$  è detto *fattore differenziale*).

**Esempio 8.13**  $\int xe^x dx$

Applicando la formula di integrazione per parti con  $f(x) = x$  e  $g'(x) = e^x$  si ottiene

$$\int xe^x dx = xe^x - \int e^x dx = xe^x - e^x + c = (x - 1)e^x + c.$$

**Esempio 8.14**  $\int \log x \, dx$

Applicando la formula di integrazione per parti con  $f(x) = \log x$  e  $g'(x) = 1$  si ha:

$$\int 1 \cdot \log x \, dx = x \log x - \int x \cdot \frac{1}{x} \, dx = x \log x - \int 1 \, dx = x \log x - x + c$$

**Esempio 8.15**  $\int x \sin x \, dx$

In questo caso è molto facile ricavare una funzione  $g(x)$  sia scegliendo  $g'(x) = x$  che scegliendo  $g'(x) = \sin x$ . Nell'applicazione della formula ( $\clubsuit$ ) con la scelta  $g'(x) = x$  si ottiene

$$\int x \sin x \, dx = \frac{1}{2}x^2 \sin x - \frac{1}{2} \int x^2 \cos x \, dx$$

ma purtroppo la nuova funzione da integrare ha un aspetto più ostile di quella di partenza. Invece la scelta di  $g'(x) = \sin x$  porta a

$$\int x \sin x \, dx = -x \cos x + \int \cos x \, dx = -x \cos x + \sin x + c.$$

Può anche capitare di dover applicare la formula ( $\clubsuit$ ) più di una volta come nel seguente

**Esempio 8.16**  $\int e^x \cos x \, dx$

In questo caso la scelta  $f(x) = e^x$  porta a:

$$\int e^x \cos x \, dx = e^x \sin x - \int e^x \sin x \, dx$$

Dobbiamo ora determinare una primitiva di  $e^x \sin x$ . Riapplicando ( $\clubsuit$ ), ancora con  $f(x) = e^x$  si ottiene

$$\int e^x \sin x \, dx = -e^x \cos x + \int e^x \cos x \, dx.$$

In definitiva

$$\begin{aligned} \int e^x \cos x \, dx &= e^x \sin x - \int e^x \sin x \, dx \\ &= e^x \sin x - \left( -e^x \cos x + \int e^x \cos x \, dx \right) \\ &= e^x (\sin x + \cos x) - \int e^x \cos x \, dx. \end{aligned}$$

Da cui

$$2 \int e^x \cos x \, dx = e^x (\sin x + \cos x)$$

e quindi si ottiene

$$\int e^x \cos x \, dx = \frac{1}{2}e^x (\sin x + \cos x) + c.$$



## 8.5 Integrazione delle funzioni razionali

Esiste un metodo generale che permette di calcolare l'integrale indefinito di funzioni razionali, ossia di funzioni che sono il rapporto di due polinomi  $N(x)$  e  $D(x)$

$$f(x) = \frac{N(x)}{D(x)}$$

purché si riesca a scomporre il denominatore in fattori di primo grado e/o fattori irriducibili di secondo grado. Per polinomi reali questa scomposizione esiste sempre, e la sua determinazione richiede la conoscenza delle radici del polinomio (cosa che non è sempre realizzabile in modo concreto).

Ricordiamo che se il grado del numeratore  $N(x)$  è maggiore o uguale al grado di  $D(x)$  la divisione tra polinomi (vedi MiniMat, Lezione 3) porta a

$$\frac{N(x)}{D(x)} = Q(x) + \frac{R(x)}{D(x)}$$

dove  $Q(x)$ ,  $R(x)$  sono polinomi, e il grado di  $R(x)$  è inferiore a quello di  $D(x)$ . Perciò, poichè il calcolo di  $\int Q(x) dx$  è immediato, ci occupiamo solo di frazioni del tipo  $\frac{N(x)}{D(x)}$  dove il grado di  $N(x)$  è inferiore a quello di  $D(x)$ .

Non esponiamo il metodo in generale per il calcolo di

$$\int \frac{N(x)}{D(x)} dx$$

ma ci limitiamo ad illustrare alcuni esempi, in cui il denominatore  $D(x)$  ha grado al più 2.

1. Se il denominatore è un polinomio di primo grado la funzione ha la forma

$$f(x) = \frac{1}{\alpha x + \beta}$$

con  $\alpha \neq 0$ . In questo caso l'integrazione è semplice e si ottiene

$$\int \frac{1}{\alpha x + \beta} dx = \frac{1}{\alpha} \log |\alpha x + \beta| + c$$

2. Consideriamo il caso in cui il denominatore ha grado 2 (ossia  $D(x) = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$ , con  $\alpha \neq 0$ ); in questo caso il numeratore ha grado minore o uguale ad 1. Il procedimento da seguire per determinare l'integrale generale è diverso a seconda che il denominatore abbia discriminante  $\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma$  positivo, nullo o negativo.

- (a) Caso  $\Delta > 0$ . La frazione  $\frac{N(x)}{D(x)} = \frac{mx + q}{x^2 + \beta x + \gamma}$  può sempre essere scritta come somma di due frazioni con denominatori di  $I$  grado. Per farlo, è sufficiente trovare le due radici di  $D(x)$ . Ad esempio:

$$\frac{x + 1}{x^2 - 3x + 2} = \frac{x + 1}{(x - 1)(x - 2)} = \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{x - 2}$$

con  $A$  e  $B$  costanti opportune. Per determinare queste costanti, sviluppiamo i calcoli dell'ultima uguaglianza:

$$\frac{x + 1}{(x - 1)(x - 2)} = \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{x - 2} = \frac{(A + B)x - 2A - B}{(x - 1)(x - 2)}$$

da cui

$$x + 1 = (A + B)x - 2A - B.$$

Ciò deve valere per ogni  $x$ , per cui otteniamo il sistema

$$\begin{cases} A + B = 1 \\ -2A - B = 1 \end{cases} \quad \text{ossia} \quad \begin{cases} A = -2 \\ B = 3 \end{cases}.$$

Quindi

$$\begin{aligned} \int \frac{x+1}{x^2-3x+2} dx &= \int \frac{(-2)}{x-1} dx + \int \frac{3}{x-2} dx = \\ &= -2 \log|x-1| + 3 \log|x-2| + c \end{aligned}$$

- (b) Caso  $\Delta = 0$ . In questo caso  $D(x)$  è il quadrato di un binomio di  $I$  grado. Analogamente a prima, cerchiamo due costanti  $A$  e  $B$  in modo che  $\frac{N(x)}{D(x)}$  si scriva come somma di due frazioni; ad esempio:

$$\frac{x+3}{x^2-2x+1} = \frac{x+3}{(x-1)^2} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} = \frac{Ax-A+B}{(x-1)^2}.$$

Risolvendo il sistema che si ottiene ponendo che, per ogni  $x$ , valga l'uguaglianza

$$Ax - A + B = x + 3$$

si ottiene  $A = 1$  e  $B = 4$  e quindi

$$\begin{aligned} \int \frac{x+3}{x^2-2x+1} dx &= \int \frac{1}{x-1} dx + \int \frac{4}{(x-1)^2} dx \\ &= \log|x-1| - \frac{4}{x-1} + c. \end{aligned}$$

- (c) Caso  $\Delta < 0$ . Il denominatore  $D(x)$  non ha radici reali. Scriviamo  $N(x)$  come  $AD'(x) + B$  con  $A, B$  costanti opportune (e dove  $D'(x)$  è la derivata del denominatore). Ad esempio:

$$\frac{6x+7}{x^2+4x+5} = \frac{A(2x+4) + B}{x^2+4x+5}.$$

da cui si ricava  $A = 3$  e  $B = -5$ .

Il termine  $\frac{D'(x)}{D(x)}$  porta alla primitiva  $\log|D(x)|$  e quindi

$$\begin{aligned} \int \frac{6x+7}{x^2+4x+5} dx &= 3 \int \frac{2x+4}{x^2+4x+5} dx - 5 \int \frac{1}{x^2+4x+5} dx \\ &= 3 \log|x^2+4x+5| - 5 \int \frac{1}{x^2+4x+5} dx \end{aligned}$$

Ora, conviene ricordare che un trinomio di  $II$  grado con discriminante negativo non cambia mai segno, per cui è sempre positivo, o sempre negativo, a seconda che lo sia il coefficiente di  $x^2$  (o, se ci piace di più, a seconda che lo sia il termine noto). Se, come

nell'esempio, il trinomio è sempre positivo, possiamo innanzitutto eliminare il valore assoluto. Inoltre, scriviamo il trinomio come somma di quadrati nel modo seguente

$$x^2 + 4x + 5 = (x + 2)^2 + 1$$

da cui  $\int \frac{1}{x^2 + 4x + 5} dx = \int \frac{1}{(x + 2)^2 + 1} dx$ .

Mediante la sostituzione  $x + 2 = t$  si ottiene

$$\int \frac{dt}{1 + t^2} = \arctan t + c, \quad \text{cioè} \quad \int \frac{dx}{1 + (x + 2)^2} = \arctan(x + 2) + c$$

e quindi otteniamo

$$\begin{aligned} \int \frac{6x + 7}{x^2 + 4x + 5} dx &= 3 \log(x^2 + 4x + 5) - 5 \int \frac{1}{x^2 + 4x + 5} dx \\ &= 3 \log(x^2 + 4x + 5) - 5 \arctan(x + 2) + c. \end{aligned}$$

Illustriamo il procedimento da seguire in quest'ultimo caso con un altro esempio.

**Esempio 8.17** Determinare l'integrale indefinito della funzione

$$f(x) = \frac{x}{x^2 + x + 1}.$$

Il trinomio  $D(x) = x^2 + x + 1$  ha discriminante  $\Delta = -3 < 0$  e termine noto  $1 > 0$ , per cui assume sempre valori positivi. La sua derivata è  $D'(x) = 2x + 1$ , per cui cerchiamo due costanti  $A$  e  $B$  tali che, per ogni  $x$ , valga

$$A(2x + 1) + B = x.$$

Si trova che  $A = \frac{1}{2}$  e  $B = -\frac{1}{2}$  e quindi

$$\begin{aligned} \int \frac{x}{x^2 + x + 1} dx &= \frac{1}{2} \int \frac{2x + 1}{x^2 + x + 1} dx - \frac{1}{2} \int \frac{1}{x^2 + x + 1} dx \\ &= \frac{1}{2} \log(x^2 + x + 1) - \frac{1}{2} \int \frac{1}{x^2 + x + 1} dx \end{aligned}$$

Inoltre, il denominatore può essere scritto come somma di quadrati nel seguente modo

$$x^2 + x + 1 = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} = \frac{3}{4} \left[ \frac{4}{3} \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + 1 \right] = \frac{3}{4} \left[ \left(\frac{2}{\sqrt{3}}x + \frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 + 1 \right].$$

Quindi

$$\frac{1}{x^2 + x + 1} = \frac{4}{3} \frac{1}{1 + \left(\frac{2}{\sqrt{3}}x + \frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2}.$$

Infine con il cambio di variabile  $\frac{2}{\sqrt{3}}x + \frac{1}{\sqrt{3}} = t$  (e quindi  $dx = \frac{\sqrt{3}}{2}dt$ ) ci si riporta ad un integrale di un arcotangente e si ottiene

$$\int \frac{dx}{x^2 + x + 1} = \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{2}{\sqrt{3}}x + \frac{1}{\sqrt{3}}\right) + c.$$

In definitiva si ha quindi che

$$\begin{aligned}\int \frac{x}{x^2 + x + 1} dx &= \frac{1}{2} \log(x^2 + x + 1) - \frac{1}{2} \int \frac{1}{x^2 + x + 1} dx \\ &= \frac{1}{2} \log(x^2 + x + 1) - \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{2}{\sqrt{3}}x + \frac{1}{\sqrt{3}}\right) + c.\end{aligned}$$

**Esempio 8.18** Determinare l'integrale indefinito della funzione

$$f(x) = \frac{4x + 5}{x^2 + 2x + 1}.$$

Il trinomio  $D(x) = x^2 + 2x + 1 = (x + 1)^2$  ha derivata  $D'(x) = 2(x + 1)$  e quindi  $N(x) = 2D'(x) + 1$ . Perciò:

$$\int \frac{4x + 5}{x^2 + 2x + 1} dx = 2 \int \frac{D'(x)}{D(x)} dx + \int \frac{1}{(x + 1)^2} dx = 4 \log|x + 1| - \frac{1}{x + 1} + c.$$